Trachycystis 属に特徴的なものである。 Rhizomnium minutulum (コウチワチョウチンゴケ) と R. striatulum (スジチョウチンゴケ) の仮根からは,ほとんどすべての部分から,プロトネマがあらたに生じた。 R. tuomikoskii の propagula では,その先端と,仮根に付着していた部分との両極から,また仮根では,propagula が付着していた部分からのみ プロトネマが分化した。 R. tuomikoskii と同様に propagula をつくる種としては R. horikawae が知られているが,両種の propagula の間には形態上,はっきりとした違いが認められる。発達したプロトネマはすべてカウロネマとクロロネマとからなり,異質糸状性をしめした。茎葉体の分化は T. flagellaris でのみ観察されている。

OAdditional critical taxonomic changes concerning the plants of Okinawa and the Southern Ryukyu Islands (Egbert H. Walker)

エグバト H. 和嘉: 琉球植物に関する分類学的新知見補遺

The following nomenclatural changes are published here in addition to those published in the Journal of Japanese Botany, 46: 55-72, March 1971, in anticipation of their need in a coming Flora of Okinawa and the Southern Ryukyus, where it is considered inappropriate to publish such taxonmic and nomenclatural changes.

Ipomoea acuminata (Vahl) Roem. & Schult. forma albiflora (Stone) Walker, comb. nov.

Ipomoea indica (Burm.) Merr. forma albiflora Stone, in Micronesica 2: 7, f.1. 1966.

Ipomoea congesta R. Br. forma albiflora (Stone) Walker & Tawada, in Journ. Jap. Bot. 46:69. 1971.

This new combination results from the report by S. J. van Ooststroom (ex litt. July 23, 1971) that the name *Ipomoea congesta* R. Br. must be replaced by *I. acuminata* (Vahl) Roem. & Schult. This name is based on *Convolvulus acuminatus* Vahl, Symb. Bot. 3: 26. 1794, which antedates *I. congesta* R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. 1: 485. 1810. Vahl's name became *I. acuminatus* (Vahl) Roem. & Schult. Syst. Veg. 4: 228. 1819 (not *I. acuminatus* Ruiz & Pav. 1799, an illegitimate name). The trivial forma *albiflora* (Stone) Walker & Tawada, published in March 1971, is therefore here transferred.

Correction: Dr. J.F. Veldkamp of the Rijksherbarium, Leiden, Holland has noted ex litt. that *Zoysia matrella* var. tenuifolia (Willd.) Durand & Schinz ex T. Koyama, stat. nov. in Journ. Jap. Bot. 46:65. 1971, is a superfluous name. This combination was published in 1928. The following is the correct citation:

Zoysia matrella (L.) Merr. var. tenuifolia (Thiele) Sasaki, List Pl. Formosa. 80. 1928.

Basionym: Z. tenuifolia Willd ex Thiele, in Linnaea 9:309.1834.—. Mauritius.